

사용 전에 반드시 본 첨부 문서를 읽어 주십시오.  
또한 필요할 때 입을 수 있도록 소중히 보관하십시오.

얼굴과 몸에 나는 ‘털’의 생육을 보조하도록 바르는 욕모제

# 미크로젠 파스타

제 1 류 의약품

## MICROGEN PASTAE

미크로젠 파스타는 2 종류의 테스토스테론(남성 호르몬)을 주성분으로 한, 흡수되기 쉬운 크립상의 외용 욕모제로 **눈썹, 수염, 가슴 털, 겨드랑이 털, 성모 등 두발 이외의 부분에 자라는 두꺼운 털의 생육 촉진에** 발라 효과를 기대하는 제품입니다.

두발에는 사용할 수 없습니다



사용 상의 주의



금지 사항

(준수하지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 일어날 수 있습니다)

- 다음과 같은 사람은 사용하지 말 것
  - 본제의 성분에 대하여 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
  - 사용 전에 본제를 튜브에서 5mm 정도 짜내어 허벅지 안쪽 등 피부가 연한 부위에 바르고, 다음날에 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 접촉성 피부염, 붓기 등의 증상이 나타난 사람
  - 안드로겐 의존성 종양(예: 전립선 종양, 남성 유선암(악성)) 혹은 그릴 가능성이 있는 사람
  - 임부, 임신 중일 가능성이 있는 여성, 수유부
  - 소아(만 15세 미만)
  - 비뇨 곤란을 동반한 전립선 비대증이 있는 사람
  - 전립선 검사\* 결과, 전립선특이항원(PSA)의 수치가 2.0ng/mL 이상인 사람(의사의 판단에 따를 것)
    - \*본제의 유효 성분(테틸테스토스테론, 프로피오네이트 테스토스테론)은 전립선 종양을 진행시킬 우려가 있습니다.
      - 특히 만 50세 이상의 남성은 전립선 종양에 걸릴 확률이 높아지므로, 본제 사용 전에 전립선 검사를 받을 필요가 있습니다.
      - 계속해서 사용하는 사람은 정기적으로 검사를 받을 필요가 있습니다.
      - 검사 결과 이상이 있는 경우에는 즉시 본제 사용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담할 것.
  - 수면 시 무호흡 증후군인 사람
  - 원형 탈모증인 사람
- 다음 부위에 사용하지 말 것
  - 눈이나 눈 주위, 점액(구강, 비강 등)
  - 두발, 속눈썹
  - 음경부 끝(요도구), 치부의 점액부
  - 외상, 염증, 습진, 짓무름, 화농 등이 있는 부위
- 본제를 사용하는 동안에는 남성 호르몬이 함유된 어떠한 의약품도 사용하지 않을 것
- 사용자 이외에게는 묻히지 말 것
  - 사용 후에는 비누와 미온수로 손을 충분히 씻어 주십시오.
  - 본제를 사용자 이외의 사람에게 묻히지 않도록 주의하여 주십시오. 묻힌 경우에는 즉시 씻어 주십시오.
  - 도포부가 다른 사람과 접촉할 가능성이 있을 때는 도포부를 비누와 미온수로 충분히 씻어 주십시오.



상담 요망

- 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사 또는 약사에게 상담할 것
  - 의사의 치료를 받고 있는 사람
  - 전립선 비대증이지만 비뇨 곤란을 동반하지는 않은 사람
  - 약이나 화장품 등으로 인한 알레르기 증상(발진 및 발적, 가려움, 접촉성 피부염, 붓기 등)이 일어난 적이 있는 사람
  - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
  - 중도의 심장병, 신장병, 간장병, 고혈압 또는 그 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우에는 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하여 의사 또는 약사에게 상담할 것
  - 사용 후 다음 증상이 나타난 경우

관련 부위	증상
피부(도포한 곳)	발진 및 발적, 붓기, 접촉성 피부염, 가려움, 수포, 부스럼

- (2) 1~3 개월 사용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우
- (3) 월경 이상, 혹은 변성 등의 남성화 징후가 나타난 경우
- (4) 오용(잘못 사용)한 경우

**효 능**

남녀 모두의 무모증, 빈모증  
(안면, 흉부, 사지, 겨드랑이, 치부의 탈모 촉진과 육모)

**용법 및 용량**

1 일 1~2 회, 1 회 0.1g~0.3g 을 원하는 부위에 바르고 문지른다.

**자세한 사용 방법**

튜브의 뚜껑을 열고 그 돌기로 튜브의 입구를 열어 도포 면적의 크기에 따라 아래와 같이 적량을 문질러 바릅니다.

- ◆ 눈썹에는 1 회 0.1g 정도(콩알 정도)를 1 일 1~2 회, 눈썹머리 쪽부터 눈썹꼬리 쪽으로 가볍게 문지르십시오.
- ◆ 체모(성모)의 무모나 빈모에는 1 회 0.1g~0.3g 을 1 일 1~2 회, 점막 부분에 닿지 않도록 주의하며 하복부에 발라 주십시오.
- ◆ 수염, 가슴 털 등에는 도포 부분의 넓이에 따라 1 회 0.1g~0.3g 을 손가락으로 잘 펴듯이 발라 1 일 1~2 회씩 사용하여 주십시오.
- ◆ 남용하지 않도록 주의하십시오.

**용법 및 용량에 관한 주의**

- (1) 정해진 용법 및 용량을 엄수하십시오.
- (2) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만에 하나 눈에 들어간 경우에는 바로 물 또는 미온수로 씻어 내십시오.  
또한 증상이 심한 경우에는 안과의의 진찰을 받으십시오.
- (3) 사용 전후에는 손끝을 잘 씻으십시오.
- (4) 도포부를 깨끗이 한 뒤 사용하십시오.
- (5) 외용제로만 사용하십시오.
- (6) 마이크로겐 파스타는 즉효성이 아니며, 일반적으로 1 개월부터 2~3 개월 정도 연속 사용이 필요합니다. 그러나, 효과에는 개인차가 있으므로 1~2 개월을 계속 사용해도 반응이 나타나지 않는 경우 기대하는 효과를 얻지 못할 수도 있으니 그 이상 사용하는 것은 추천하지 않습니다.
- (7) 고령자(만 65 세 이상) 사용 시 효과를 기대할 수 없는 경우가 있습니다.
- (8) 백발이 흑발이 되는 효과는 없습니다.

**성분 및 분량**

본제 1 g 중

유효 성분	함량
메틸테스토스테론	10mg
프로피오네이트 테스토스테론	5mg

첨가물로 스테아릴 알코올, 프로필렌 글리콜, 폴리옥시에틸렌하이드로제네이티드캐스터오일, 글리세릴 스테아레이트, 파라벤, 바셀린, 콜레스테롤, 감광소 301 호, 향료를 함유합니다.

**보관 및 취급 상의 주의**

- (1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적고 서늘한 장소에 뚜껑을 꼭 단아서 보관하십시오.
- (2) 유아의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- (4) 사용 기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.
- (5) 본제를 너무 많이 짤 경우 튜브에 다시 넣지 마십시오.
- (6) 본제를 튜브에서 짜내기 어려울 경우, 손바닥 등으로 1~2 분 데워 주십시오.

내포: 6g 입, 12g 입, 30g 입(30g 입은 체모용에 적량)  
전국의 약국 드러그 스토어 및 백화점의 약품부에 있습니다.

...문의처...

케이호도 제약 주식회사 고객 상담실

☎03-3828-5663 접수 시간 9:00~17:00(주말, 공휴일 제외)

-제조판매원-

**케이호도 제약 주식회사**

도쿄도 분쿄구 센다기 1-22-3

☎03-3821-0085(대표전화)